

Oggetto: [Benza.it] Newsletter di Agosto 2011

Mittente: "Newsletter Benza.it" <newsletter@benza.it>

Data: 01/08/2011 14.37

A: receivers@benza.it

[Acquisti.Benza.it](#)

Servizio Newsletter: Lunedì 1 Agosto 2011

Vi informiamo, che resteremo **chiusi per ferie** da sabato 13 Agosto a Domenica 21 Agosto 2011 ed auguriamo a tutti buone vacanze.

Ed ecco i consueti utili consigli del ns. agronomo, Dott. Enrico Leva, per l'estate:

TAPPETO ERBOSO

Taglio: durante i mesi estivi l'altezza di taglio deve essere mantenuta a circa 5 cm.

Irrigazione: può sembrare strano ma occorre ridurre le irrigazioni in corrispondenza di periodi caldi ed umidi. Il prato non soffre per il caldo secco ma per il caldo umido che favorisce quelle chiazze di erba secca erroneamente scambiate per carenze d'acqua. Niente di più sbagliato: si tratta dell'inizio di infezioni fungine. I funghi sono favoriti dal permanere di umidità: ecco perché bisogna bagnare abbondantemente e poi lasciare all'asciutto il prato per 3-4 giorni, irrigando al mattino presto, per eliminare la rugiada.

Trattamenti fungicidi: i trattamenti devono essere effettuati possibilmente nelle ore più fresche della giornata; molto adatte le ore del tramonto.

ORTO

L'estate in corso si caratterizza per precipitazioni superiori alla media: ciò aumenta i rischi di malattie come la temibile peronospora. In seguito ad ogni pioggia si deve eseguire un trattamento con rame per scongiurare l'insorgenza di malattie. Per aumentare la consistenza e la gradevolezza dei frutti, si può eseguire una concimazione fogliare con potassio liquido.

FRUTTETO

Operazioni colturali: si deve proseguire con la potatura verde dei fruttiferi, comprendente altresì la curvatura e la piegatura dei rami.

Difesa:

- L'insetto più temibile è la *Cydia*, che scava gallerie nei frutti e/o nei germogli; consigliamo un insetticida con brevissimo tempo di carenza (es. Decis).
- Molto aggressive, in questa stagione, sono le cocciniglie, insetti che formano ammassi ricoperti di cera (rendendoli appiccicosi); per eliminarle occorre, con la potatura, "aprire" la vegetazione, consentendo l'entrata dell'aria. Si deve poi trattare con olio minerale, nelle ore più fresche della giornata.

GIARDINO

Le specie che hanno esaurito la fioritura possono essere potate; è invece un grave errore potare prima della fioritura.

Rose:

I caldi estivi, generalmente, deprimono la fioritura; con il cessare delle alte temperature, si assiste, solitamente, a fioriture successive.

- E' comunque di fondamentale importanza eliminare i getti sfioriti con un taglio netto.
- Ogni 30 gg circa concimare con un concime bilanciato NPK.
- Non bagnare le foglie con le irrigazioni per evitare l'insorgere delle malattie. In caso di attacchi, trattare con fungicidi a

base di rame

Se non vuoi più ricevere questa newsletter e sei iscritto al ns. sito, poi rimuoverti direttamente entrando nella gestione del tuo account. Se invece ti sei iscritto telefonicamente o compilando il modulo di richiesta preventivi, manda un'email senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it.

www.benza.it