

**Oggetto:** [Benza.it] I consigli dell'agronomo, speciale Prati

**Mittente:** "Newsletter Benza.it" <newsletter@benza.it>

**Data:** 12/03/2013 20.41

**A:** mastrobenza@gmail.com

### [Acquisti.Benza.it](#)

**Servizio Newsletter:** Martedì 12 Marzo 2013

Come sempre, speriamo di raggiungerVi con la nostra professionalità, motivo per il quale anche questo mese Vi forniamo i consueti ed utili consigli agronomici. **IN QUESTA NEWSLETTER**, come già promesso il mese scorso, Vi presentiamo anche uno *Speciale trattamento del prato*. Vi ringraziamo per averci seguiti ed aver apprezzato il precedente speciale di Febbraio sulle piante da frutta. In caso l'aveste perso, non esitate a contattarci e Ve lo inoltreremo nuovamente.

I CONSIGLI DEL NOSTRO AGRONOMO, il Dott. Enrico Leva:

#### **ORTO**

Come già ricordato nella precedente newsletter, la rotazione delle colture è fondamentale.

Molto utile può essere la realizzazione di aiuole leggermente sopraelevate rispetto al terreno al fine di favorire lo sgrondo delle acque e di migliorare l'insolazione in prossimità delle radici.

Per proteggere le piantine appena trapiantate da eventuali ritorni di freddo si consiglia la copertura notturna con tessuto non tessuto (detto velo di sposa) (<http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=TNT17,1>)

#### **FRUTTETO**

Durante la fioritura è bene sospendere qualsiasi lavorazione. È importante sospendere qualsiasi trattamento per non danneggiare le api.

Si ricorda che alcune specie necessitano di impollinatori ossia di varietà diverse che rendono possibile la fecondazione dei fiori e quindi la fruttificazione. È fondamentale rispettare la presenza di tali varietà, incrementandone, se possibile, la loro quantità. Nel caso del ciliegio dolce, in fase di impianto, è preferibile piantumare varietà autofertili (ossia in grado di fruttificare anche se isolate).

Discorso diverso riguarda il kiwi: può essere utile, ad esempio con un pennellino, raccogliere il polline dai fiori maschili e portarlo su quelli femminili. Una buona dotazione di polline è infatti un elemento importantissimo per avere frutti di pezzatura accettabile.

Dal punto di vista fitopatologico si suggerisce:

- In pre e post-fioritura, un trattamento fungicida (<http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=406138>).
- Cocciniglie degli agrumi: se non presenti i fiori, trattamenti con olio bianco (<http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8936,1>).

#### **GIARDINO**

Appena terminata la fioritura delle specie quali ad esempio la mimosa, si deve procedere alla potatura. La mimosa è poi soggetta alla clorosi ferrica ossia alla decolorazione delle foglie (che diventano gialle) causata dall'impossibilità della pianta di estrarre il ferro dal terreno. Si tratta di un problema facilmente superabile con l'utilizzo di un prodotto denominato chelato di ferro (<http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=FE1,1>).

Per le piante da interno o comunque in vaso, in questa stagione si può procedere alla rotazione per quelle piante che hanno assunto una crescita sbilanciata verso la luce.

Limitatamente alle piante da interno, torneremo prossimamente con una nota specifica, ma si ricorda l'importanza (per alcune) di una adeguata umidità ambientale e pertanto si suggerisce di utilizzare gli umidificatori ambientali.

## TAPPETO ERBOSO

Nella precedente newsletter, è stato suggerito l'utilizzo del concime azotato a lenta cessione (es. <http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=EAGLE25,1>).

In questa stagione non ci sono quasi mai problemi di carenza idrica ma suggeriamo di far partire gli impianti subito dopo la concimazione con il duplice scopo di il concime al terreno e di controllare eventuali danni od altri problemi a carico dell'impianto irriguo.

E' invece di fondamentale importanza eseguire regolarmente i tagli: nei prossimi 3 mesi il prato risponde egregiamente agli sfalci. Se si possiede un comune rasaerba a spinta, è bene prevedere almeno 1 taglio ogni 7 giorni ad altezza di circa 3,5 cm (misurati rispetto al terreno). Molto utile è invece l'utilizzo del robot di taglio (<http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=AMBROGIO,1>) che provvede a sfalci continui, determinando una maggiore fittezza del prato unitamente ad una minore presenza di erbe infestanti. L'eventuale maggiore produzione di feltro è facilmente superabile con le arieggiature, come di seguito descritta.

## SPECIALE PRATO

### Carotatura

Il prato si avvantaggia dell'aggiunta di sabbia al terreno perché in tal modo aumenta il drenaggio. La presenza di acqua stagnante (anche se non visibile) è fattore scatenante di malattie causate da funghi microscopici. Per questo motivo si consiglia di aggiungere sabbia. Tale aggiunta può avvenire senza necessariamente lavorarlo con la motozappa per mezzo di una carotatrice, macchina che crea ed estrae dal terreno piccoli cilindri di terra (carote). All'interno dei buchi creati è possibile far cadere la sabbia distribuita dopo il passaggio della macchina. Con una scopa metallica o una rete flessibile si sbriciolano le carote e si incorpora la sabbia. Successivamente si può distribuire il seme, il concime starter ed un sottile strato di terriccio sopra il seme. Dopo alcune irrigazioni ed in presenza di temperature adeguate (10° C) si assisterà alla germinazione.

### Arieggiatura

E' utilissima per eliminare il feltro ossia quello strato di foglie morte che si deposita alla base del terreno e che è responsabile di malattie fungine. Si elimina con gli arieggiatori manuali o meccanici. Da evitare assolutamente il comune rastrello perché danneggia troppo il prato. E' infatti uno strumento che è nato per una funzione specifica e cioè sminuzzare il terreno in vista della semina.

Per quanto riguarda gli arieggiatori meccanici ne esistono di due tipi: quelli a lame oppure a molle.

I primi sono più adatti per incidere il terreno in caso di nuova semina; quelli a molle per la sola pulizia dal feltro. Si ricorda che l'arieggiatore non è una motozappa e che nel caso delle lame queste devono incidere superficialmente il terreno mentre, nel caso delle molle, questo deve essere sfiorato.

Può esser utile eseguire un doppio passaggio incrociato, cioè ortogonali tra loro.

Prima dell'arieggiatura e/o della carotatura è bene provvedere ad un taglio basso dell'erba esistente.

Riepilogando, questo può essere il programma dei lavori per la rigenerazione del prato a fine inverno:

- Taglio basso con rasaerba;
- Carotatura: si possono eseguire due passaggi incrociati;
- Distribuzione di sabbia per uno strato di circa 5 mm
- Passaggio di scopa metallica o rete flessibile;
- Arieggiatura a lame;
- Distribuzione di seme, concime starter e terriccio sabbioso (al solo scopo di coprire il seme);
- Leggera irrigazione.

Nel caso in cui il prato si presenti ancora in condizioni discrete, si può intervenire nel modo seguente:

- Taglio basso con rasaerba;
- Arieggiatura a molle: si possono eseguire due passaggi incrociati;
- Raccolta del feltro con scopa metallica oppure con passaggio di rasaerba ad altezza massima della lama (poiché deve solo creare il vortice d'aria);
- Distribuzione di concime azotato a lenta cessione;
- Leggera irrigazione.

Infine si ricorda che prima di operare con le macchine è buona norma segnare (ad esempio con delle bandierine) la disposizione di irrigatori e/o di altri manufatti.

### CRONOPROGRAMMA TAPPETI ERBOSI

| <b>MESE</b>     | <b>OPERAZIONI</b>                                          | <b>PRODOTTI - ATTREZZATURE</b>                                                       | <b>DOSI</b>                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gennaio</b>  | Taglio settimanale erba a 4 cm                             | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
| <b>Febbraio</b> | Taglio settimanale erba a 4 cm                             | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
| <b>Marzo</b>    | Taglio settimanale erba a 4 cm                             | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
|                 | Rigenerazione (1)                                          | Arieggiatore a lame, seme Royal, concime Starter, terriccio per tappeti erbosi Benza | Seme e concime 30 g/mq                            |
|                 | Arieggiatura a molle                                       | Arieggiatore a molle                                                                 |                                                   |
|                 | Concimazione                                               | Concime Eagle                                                                        | 30 g/mq                                           |
| <b>Aprile</b>   | Taglio settimanale erba a 4 cm                             | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
|                 | Diserbo pre-emergenza                                      | Bluecontact                                                                          | 15 g/mq (da distribuire a secco)                  |
| <b>Maggio</b>   | Taglio settimanale erba a 4 cm                             | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
|                 | Trattamenti fungicidi (preventivi-curativi)                | Flint e/o Previcur Energy                                                            | 2 g/10 litri di acqua e/o 30 ml/10 litri di acqua |
|                 | Diserbo post-emergenza contro le infestanti a foglia larga | Dicotex                                                                              | 100 ml/100 mq; da diluire in 10 litri di acqua    |

|               |                                                              |                           |                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Giugno</b> | Taglio erba (circa 3 interventi/mese) a 4-4,5 cm             | Rasaerba affilato         |                                                   |
|               | Arieggiatura a molle                                         | Arieggiatore a molle      |                                                   |
|               | Concimazione                                                 | Eagle-K                   | 30 g/mq                                           |
|               | Trattamenti fungicidi (preventivi-curativi)                  | Flint e/o Previcur Energy | 2 g/10 litri di acqua e/o 30 ml/10 litri di acqua |
|               | Diserbo pre-emergenza                                        | Bluecontact               | 15 g/mq (da distribuire a secco)                  |
|               | Diserbo post-emergenza contro le infestanti a foglia larga   | Dicotex                   | 100 ml/100 mq; da diluire in 10 litri di acqua    |
|               | Diserbo post-emergenza contro le infestanti a foglia stretta | Greenex                   | 50 ml/100 mq; da diluire in 5 litri di acqua      |
| <b>Luglio</b> | Taglio erba (circa 3 interventi/mese) a 4-4,5 cm             | Rasaerba affilato         |                                                   |
|               | Trattamenti fungicidi (preventivi-curativi)                  | Flint e/o Previcur Energy | 2 g/10 litri di acqua e/o 30 ml/10 litri di acqua |
|               | Diserbo post-emergenza contro le infestanti a foglia larga   | Dicotex                   | 100 ml/100 mq; da diluire in 10 litri di acqua    |
|               | Diserbo post-emergenza contro le infestanti a foglia stretta | Greenex                   | 50 ml/100 mq; da diluire in 5 litri di acqua      |
| <b>Agosto</b> | Taglio erba (circa 3 interventi/mese) a 4-4,5 cm             | Rasaerba affilato         |                                                   |
|               | Diserbo pre-emergenza                                        | Bluecontact               | 15 g/mq (da distribuire a secco)                  |

|                  |                                                              |                                                                                      |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Trattamenti fungicidi (preventivi-curativi)                  | Flint e/o Previcur Energy                                                            | 2 g/10 litri di acqua e/o 30 ml/10 litri di acqua |
|                  | Diserbo post-emergenza contro le infestanti a foglia larga   | Dicotex                                                                              | 100 ml/100 mq; da diluire in 10 litri di acqua    |
|                  | Diserbo post-emergenza contro le infestanti a foglia stretta | Greenex                                                                              | 50 ml/100 mq; da diluire in 5 litri di acqua      |
| <b>Settembre</b> | Taglio settimanale erba a 4 cm                               | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
|                  | Rigenerazione (1)                                            | Arieggiatore a lame, seme Royal, concime Starter, terriccio per tappeti erbosi Benza | Seme e concime 30 g/mq                            |
|                  | Arieggiatura a molle                                         | Arieggiatore a molle                                                                 |                                                   |
|                  | Concimazione                                                 | Eagle                                                                                | 30 g/mq                                           |
| <b>Ottobre</b>   | Taglio settimanale erba a 4 cm                               | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
| <b>Novembre</b>  | Taglio settimanale erba a 4 cm                               | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |
|                  | Arieggiatura a molle                                         | Arieggiatore a molle                                                                 |                                                   |
|                  | Concimazione                                                 | Eagle-K                                                                              | 30 g/mq                                           |
| <b>Dicembre</b>  | Taglio settimanale erba a 4 cm                               | Rasaerba affilato                                                                    |                                                   |

N.B. Le suddette date sono da ritenersi puramente indicative in quanto devono essere connaturate al reale andamento climatico.

L'esecuzione dell'arieggiatura a molle è consigliabile poiché si elimina il feltro che in parte blocca i prodotti (concimi e agrofarmaci).

(1) Da eseguirsi solo dopo eventi climatici molto penalizzanti ed anche dopo forti attacchi fungini.

**Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!**

[Benza Irrigazioni Sanremo](#)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un'email senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo: [davide@benza.it](mailto:davide@benza.it) oppure, se sei registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account.